

FIBROMIALGIA-AFECTACIÓN DE LAS FUNCIONES COGNITIVAS.

Servicio de Neurología. Htal. Gral. De Agudos Dr. Cosme Argerich.
CENER. Centro de Neurología y Recuperación Psicofísica. Gral. Galarza. Entre Ríos.

Sanfilippo, Santiago; Sanfilippo, Romina, Rodríguez, F; Taboada, Z; Vigo, F; Albanese, G;
Fiorotto, L, Guerreros, R; Florín, Y; Perez, C, Landriscina, P; Buezas, M.

INTRODUCCIÓN

La fibromialgia (FM) podría ser considerada como un Síndrome de dolor crónico referido a diferentes estructuras del sistema musculoesquelético pero sin evidencia de patología en las mismas.

OBJETIVOS

El objetivo de este trabajo es definir si existe un patrón de disfunción cognitiva en un grupo de pacientes que presentan sintomatología compatible con fibromialgia.

METODOS

Se incluyeron en este trabajo 82 pacientes con diagnóstico de Fibromialgia todos mayores de edad, 8 varones con una edad media de 45 años y 74 mujeres con una edad media de 58 años. El nivel de educación media fue similar en todos los pacientes.

Estos pacientes fueron seleccionados de un grupo total de 120 pacientes teniendo en cuenta la ausencia de problemas respiratorios, síndrome de apnea del sueño, hipersomnias, hipertiroidismo, diabetes y nivel educacional.

El examen neuropsicológico incluyó el MMSE y una batería de tests que exploran los dominios cognitivos, memoria, lenguaje, praxias, funciones ejecutivas, depresión y ansiedad.

En la selección de los mismos se tuvo en cuenta la factibilidad de realización de los mismos, su eficacia en la evaluación y su estandarización.

Las performances fueron consideradas normales o patológicas de acuerdo a la comparación con los valores obtenidos en estudios estandarizados.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

De acuerdo a los datos obtenidos en nuestro estudio se observa claramente que en 60 de los 82 pacientes estudiados se manifiestan disfunciones cognitivas significativas donde se evidencian especialmente:

- déficit en atención focalizada y sostenida,
- Alteración de la memoria de corto plazo y episódica (inmediata y diferida)
- Déficit en la visuopercepción.

Con respecto a los rasgos de la personalidad podemos decir que el grupo de pacientes estudiados presentan cambios en la misma, lo cual se traduce en modificaciones, a veces significativa, en la esfera conductual, predominando la apatía (disminución en la motivación), retraimiento social y reducción de las relaciones interpersonales. En el 50% de los casos se evidencian síntomas depresivos y/o ansiosos.

ENVIADO

